



شماره سند: ب-۱-۱-۱۳

راهنمای گرفتن نمونه مدفوع



رایج ترین کاربرد آزمایش مدفوع تشخیص انواع مختلف انگل های بیماری زا در روده است و گاهی جهت تشخیص خون مخفی در مدفوع در سه نوبت نمونه گرفته می شود.

- بیوتیک ها خودداری نمائید.
- بهتر است این آزمایش در سه نوبت انجام شود .
- نمونه مدفوع به وسیله قاشقک درب ظرف نمونه جمع آوری شود .
- در صورت مشاهده انگل ،خون و یا خلط از آن قسمت نمونه برداری کنید.
- نمونه مدفوع نباید با ادرار و یا آب آلوده شود زیرا ادرار می تواند برخی از انگل های فعال را از بین ببرد .
- ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش مصرف داروهای آهن. ایندومتاسین.کلشی سین. آسپرین. بروفن. کورتون ها و ویتامین سی قطع شود.
- در صورتیکه رساندن نمونه غیر اسهالی به آزمایشگاه مقدور نیست، نمونه را در یخچال قرار دهید و حداکثر ظرف مدت پنج ساعت به آزمایشگاه برسانید.
- در مورد نمونه های اسهالی بایستی فوراً به آزمایشگاه انتقال داده شود.
- حتماً توجه داشته باشید که قبل از گذاشتن ظرف نمونه در جایگاه مخصوص ازمصدی پذیرش برجسب مشخصات کودک را تحویل بگیرید و بر روی نمونه برجسب بزنید.

منبع: (Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Method)

تهیه کننده: مریم نایع بردبار کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی

تأیید کننده: دکتر فاطمه خواجه پاتولوژیست

واحد آموزش ارتقاء سلامت

تابستان ۱۴۰۰

