



شماره سند: ب-۱-۱۰-۷



راهنمای گرفتن نمونه ادرار و کشت ادرار در شیرخواران

- دست های خود را بشوید.
- کودک را رو پارچه تمیز قرار دهید.
- کود را به پشت بخوابانید به طوری که پاها از هم فاصله داشته باشد.
- دستکش تمیز بپوشید.
- ناحیه پرینه (فاصله مقعد و اندام تناسلی) را با آب و صابون بشوید و با گاز استریل خشک کنید.
- در دختران ناحیه تناسلی را از سمت بالا به سمت مقعد تمیز شود و در پسرها آلت به صورت دایره وار به سمت بیضه تمیز شود.
- برچسب کیسه ادراری که در پسران دایره و در دختران بیضی است را بردارید.
- کیسه ادرار را از سمت پایین به بالا بچسبانید به طوری که در دختران لبیای بزرگ و در پسران آلت تناسلی و بیضه ها را بپوشاند.
- در صورت عدم ادرار کودک بعد از ۱۵ دقیقه، کیسه را تعویض و مراحل ضد عفونی را تکرار کنید.
- پس از کسب ادرار کیسه را جدا کرده و ظرف مدت ده دقیقه تحویل آزمایشگاه دهید.
- در صورتیکه مقدور نیست می توان تا شش ساعت ادرار را در یخچال نگهداری نمود و بعد از آن به آزمایشگاه فرستاده شود.
- بهتر آن است که از نمونه ادرار تازه استفاده شود.

منبع: Urinalysis and body fluids – Marjorie Diloranzo (2014) And Text Book Of Nursing care Standards

تهیه کننده: فاطمه غالبی کارشناس پرستاری

تأیید کننده: دکتر علی امانتی فوق تخصص عفونی اطفال

واحد آموزش سلامت

تابستان ۱۴۰۴

