



راهنمای گرفتن نمونه ادرار از طریق شکم (آسپیراسیون سوپراپیویک)

شماره سند: ب-۱-۱۰-۱۰۸

جهت تشخیص عفونت ادراری از طریق نمونه ادرار تمیز و استریل و کمترین میزان الودگی ادرار نیاز به گرفتن نمونه ادرار به صورت مستقیم از طریق سوپراپیویک توسط پزشک، می باشد که به خصوص در کودکان و نوزادان کاربرد دارد.

طریقه نمونه گیری:

پزشک پس از ضد عفونی کردن پوست با وارد کردن سوزن از طریق پوست ناحیه مناسب زیر ناف وارد مثانه می شود و نمونه ادرار را مستقیم از این ناحیه می گیرد که بعد از گرفتن نمونه ادرار، نمونه را داخل ظرف استریل ریخته و به آزمایشگاه ارسال می شود.
در این روش نیاز به بیهوشی و بی حسی وجود ندارد و اگر به هر دلیلی نمونه گیری موفقیت آمیز نبود، بعد از ۳۰ دقیقه می توان نمونه گیری را تکرار کرد.

آمادگی جهت انجام آسپیراسیون سوپراپیویک:

- مثانه کودک باید پر باشد، بنابراین او را به خوردن مایعات تشویق نمایید و پس از ۱۵ دقیقه شیردهی یا خوردن مایعات، پر بودن مثانه را با لمس ناحیه زیر ناف بررسی کنید.
- از بیمار/ قیم بیمار، بعد از توضیح انجام کار و عوارض آن رضایت آگاهانه و کتبی اخذ نموده می شود.



منبع: پرستاری داخلی جراحی برونر - سودارت مجاری ادراری ۲۰۲۴

تهیه کننده: فاطمه غالبی کارشناس پرستاری

تأیید کننده: دکتر علی امانتی فوق تخصص عفونی اطفال

واحد آموزش سلامت / پاییز ۱۴۰۴