



شماره سند: ب-۱-۱۰-۶۳

راهنمای آمادگی سونوگرافی در اطفال

➤ سونوگرافی شکمی (Abdominal Sonography)

- در شیرخواران جهت سونوگرافی سیستم گوارش ، در صورتی که تنها مشمول کبد و کیسه صفرا می باشد ، نوزاد از یک ساعت قبل نبایستی شیر بخورد.
- در اطفال جهت سونوگرافی سیستم گوارش ، در صورتی که تنها مشمول کبد و کیسه صفرا می باشد ، کودک از ۳-۴ ساعت قبل نبایستی هیچ چیز (به خصوص غذا و مایعات چرب به دلیل ترشح صفرا) بخورد.
- در شیرخواران و اطفال جهت سونوگرافی سیستم گوارش ، در صورتی که جهت بررسی معده و تنگی دریچه پیلور معده باشد ، معده نوزاد بایستی کاملاً پر باشد.

➤ سونوگرافی لگن و سیستم ادراری (KUB & Pelvic Sonography)

باید مثانه پر باشد (توجه: در صورت بررسی همزمان شکم و لگن ، مایعات ساده مانند آب و آبمیوه مصرف شود مصرف مایعات چرب مثل شیر به کودک داده نشود).

منبع: Merrills Atlas Of Radiographic Positioning & Procedures

تهیه کننده: آیدا اسماعیل پور کارشناس رادیولوژی

واحد آموزش سلامت

تپاییز ۱۴۰۴