



شماره سند: ب-۱-۱۰-۱۳

راهنمای گرفتن نمونه مدفوع

رایج ترین کاربرد آزمایش مدفوع تشخیص انواع مختلف انگل های بیماری زا در روده است و گاهی جهت تشخیص خون مخفی در مدفوع در سه نوبت نمونه گرفته می شود.

- برای مدت ۷ تا ۱۰ روز پیش از انجام این آزمایش از درمان با روغن کرچک یا روغن های معدنی، بیسموت منیزیم ترکیبات ضد اسهال تنقیه با باریوم و مصرف آنتی بیوتیک ها خودداری نمائید.
- بهتر است این آزمایش در سه نوبت انجام شود .
- نمونه مدفوع به وسیله قاشقک درب ظرف نمونه جمع آوری شود .
- در صورت مشاهده انگل ،خون و یا خلط از آن قسمت نمونه برداری کنید.
- نمونه مدفوع نباید با ادرار و یا آب آلوده شود زیرا ادرار می تواند برخی از انگل های فعال را از بین ببرد .
- ۴۸ ساعت پیش از انجام آزمایش مصرف داروهای آهن، ایندومتاسین،کلشی سین، آسپرین، بروفن، کورتون ها و ویتامین سی قطع شود.
- در صورتیکه رساندن نمونه غیر اسهالی به آزمایشگاه مقدور نیست، نمونه را در یخچال قرار دهید و حداکثر ظرف مدت پنج ساعت به آزمایشگاه برسانید.
- در مورد نمونه های اسهالی بایستی فوراً به آزمایشگاه انتقال داده شود.
- حتماً توجه داشته باشید که قبل از گذاشتن ظرف نمونه در جایگاه مخصوص ازمصدی پذیرش برچسب مشخصات کودک را تحویل بگیرید و بر روی نمونه برچسب بزنید.

منبع: Henrys (Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Method)

تهیه کننده: مریم تابع بردبار کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی

تأیید کننده: دکتر فاطمه خواجه پاتولوژیست

واحد آموزش سلامت

تابستان ۱۴۰۴

