



ایمونوگلوبین IVIG

به عنوان یک درمان جایگزین پروتئین پلاسما (IGG) در بیماران دچار کمبود یا نقص ایمنی که دچار کاهش یا از دست دادن قابلیت تولید آنتی بادی هستند تجویز می شود. این فرآورده باعث ایجاد سطوح پادتن های وسیعی می شود.

موارد مصرف

- در ضعف سیستم ایمنی
- سندروم کاوازاکی
- کودکان دچار HIV
- پیوند سلول های بینادی خونساز
- نوزادان با وزن کم
- در بیماران خود ایمنی
- MS
- لوپوس
- آرتریت روماتوئید
- لنفوسیتیک مزمن

تداخلات دارویی

IVIG باعث مهار پاسخ بدن به واکسن های حاوی ویروس زنده مانند آبله مرغان، سرخچه و اوریون می شود. در صورت دریافت این واکسن تا ۳ ماه IVIG تزریق نشود و تزریق واکسن های زنده با فاصله زمانی مناسب با صلاحدید و تجویز پزشک صورت گیرد.

عوارض

عوارض این دارو یا تنظیم سرعت و مقدار تزریق قابل کنترل است ولی گاهی عوارض در سه روز اول بعد از تزریق نیز دیده می شود. سردرد، تب، خارش، سرفه، تهوع، استفراغ، درد شکم، بثورات جلدی، ناخوشی، سرگیجه، افزایش ضربان قلب

موارد منع مصرف

سابقه ی واکنش های حساسیتی یا واکنش های شدید سیستمیک بعد از دریافت ایمونوگلوبین

مصرف در بارداری

در شرایط خاص و نظارت ویژه پزشک قابل استفاده است.



مراقبت های پرستاری دارو

- قبل از تجویز دارو در صورت مبتلا بودن بیمار به اختلال عملکردی قلبی یا کلیوی و دیابت پزشک خود را مطلع نمایند.
- ویال های نیمه استفاده قابل استفاده مجدد نیست.
- تزریق دارو دارو در زمان شیردهی و بارداری مشکل ایجاد نمی کند.
- دارو در زمان تزریق کاملاً شفاف و بیرنگ و بدون وجود رسوب یا ذرات شناور باشد.
- کاهش ادرار، افزایش ناگهانی وزن یا ورم پاها می تواند نشانه ای از واکنش کلیوی به دارو باشد.
- در صورت درد و تورم و قرمزی یا برآمدگی در محل تزریق در دست یا پا به پزشک اطلاع دهید. داروی آسپیرین پیشگیری از لخته می باشد، که تجویز می شود.
- ادرار قهوه ای یا قرمز و پوست زرد از عوارض کبدی دارو است.
- برای کاهش عوارض، نوشیدن بیش از ۷ لیوان قبل از شروع تزریق و ادامه روند تا یک ماه بعد از آخرین دریافت ضروری می باشد.

منبع: داروهای ژنریک ایران و دسته بندی داروها، دکتر مصطفی صابر و سید رضا موسوی، چاپ اول، ویرایش چهارم ۱۴۰۳

تهیه کننده: فاطمه بخشی کارشناس پرستاری

تأیید کننده: دکتر صدیقه حمزوی فوق تخصص عفونی کودکان

ناظر کیفی: فاطمه غالبی سوپروایزر آموزش سلامت

تأیید کننده: ۱۴۰۴