

اوستین نوعی آنتی بادی می باشد که در درمان بیماری های چشمی تجویز می شود. در بیماران با انسداد وریدهای شبکیه و ایجاد عروق خونی نا به جا در مشیمیه تزریق آمپول اوستین انجام می گیرد تا از ایجاد عروق جدید در شبکیه چشم جلوگیری کند.

عوارض تزریق اوستین:

خونریزی زجاجیه یا شبکیه یا در زیر ملتحمه ، درد در ناحیه تزریق ، آب مروارید ، پارگی یا جداشدن زجاجیه ، افزایش فشار چشم و عفونت داخل چشمی

مراقبت های قبل و بعد از تزریق:

۱. قبل از تزریق حمام کنید و یا صورت خود را با صابون بشویید.
۲. ساعت حضور بیمار در روز تزریق ساعت ۷:۳۰ تا ۸ صبح در بخش چشم واقع در ساختمان شماره ۲ بیمارستان شهید دستغیب می باشد.
۳. استفاده از مواد آرایشی در روز تزریق تا حداقل سه روز بعد از آن اکیداً ممنوع می باشد.
۴. قطره سیپلکس از ساعت ۶ صبح روز تزریق هر شش ساعت به مدت پنج روز ریخته شود. (شب، هنگام خواب نیاز به استعمال قطره نیست.)
۵. پماد جنتامایسین از روز تزریق هر شب به مدت پنج روز استفاده شود.
۶. کلیه قطره های بیماران مبتلا به گلوکوم (آب سیاه) ادامه یابد و قطع نشود.
۷. تا ۷۲ ساعت از شستن صورت خود پرهیز نمایید و از مالش چشم و دستکاری پانسمان بعد از تزریق خودداری شود.
۸. محافظ چشم را به مدت ۷۲ ساعت پس از تزریق جهت جلوگیری از هرگونه عفونت بروی چشم خود نگه دارید.
۹. در صورت بروز درد شدید ، تورم و کاهش دید سریعاً به پزشک خود یا اتفاقات بیمارستان خلیلی مراجعه نمایید.
۱۰. بیمار روز بعد از عمل ساعت ۷ صبح به درمانگاه پوستچی مراجعه نماید.
۱۱. در صورت نیاز به مشاوره بعد از تزریق با شماره ۰۹۳۰۶۰۱۲۵۳۲ تماس حاصل فرمائید.



تهیه کننده : محبوه اکبری کارشناس پرستاری

تأیید کننده: دکتر احسان نامور فلوشیپ و فوق تخصص شبکیه و لیزر

ناظر کیفی: فاطمه غالبی سوپروایزر آموزش سلامت

تابستان ۱۴۰۴