




شماره سند: ب-۱-۱۰-۱۰۵



مراقبت های قبل و بعد از تزریق داخل چشم اوستین

۱. قبل از تزریق حمام کنید و یا صورت خود را با صابون بشویید.
۲. استفاده از مواد آرایشی در روز تزریق تا حداقل سه روز بعد از آن اکیداً ممنوع می باشد.
۳. قطره سیپلکس از ۶ صبح روز تزریق هر یک ساعت به مدت ۲۴ ساعت و پس از آن به مدت یک هفته هر سه ساعت ریخته شود. (شب، هنگام خواب نیاز به استعمال قطره نیست)
۴. پماد جنتامایسین از روز تزریق هر شب به مدت یک هفته استفاده شود.
۵. کلیه قطره های بیماران مبتلا به گلوکوم (آب سیاه) ادامه یابد و قطع نشود.
۶. تا ۷۲ ساعت از شستن صورت خود پرهیز نمایید.
۷. محافظ چشم را به مدت ۴۸ ساعت پس از تزریق جهت جلوگیری از هرگونه عفونت بر روی چشم خود نگه دارید.
۸. در صورت بروز درد شدید - تورم و کاهش دید سریعاً به پزشک خود یا اتفاقات بیمارستان خلیلی مراجعه نمایید.
۹. بیمار روز بعد از عمل ساعت ۷ صبح به درمانگاه دستغیب مراجعه نماید.



تهیه کننده: محبوبه اکبری کارشناس پرستاری

تأیید کننده: دکتر محمد کریم جوهری فوق تخصص شبکیه چشم

تابستان ۱۴۰۰