

## آب مروارید



### آب مروارید

آب مروارید کدورت عدسی چشم می باشد. آب مروارید ممکن است در هر سنی در یک یا دو چشم به علل مختلفی ایجاد شود و براساس ناحیه ای از عدسی چشم که مبتلا شده است تقسیم بندی می شود.

### علائم بیماری

- از خصوصیت مهم کاتاراکت ۱ تاری دید بدون درد است.
- احساس می کند که محیط پیرامون تار شده و نیاز به پاک کردن عینک دارد.
- حساسیت به نورهای درخشان و کاهش دقیق بینایی نزدیک بینی (توانایی انجام کارهای نزدیک بدون استفاده از عینک)
- آستینگماتیسم ۲
- دو بینی یک چشم
- تغییر رنگ عدسی



**تشخیص:** انجام تست هایی برای بررسی دقیق بینایی و محرز شدن درجه بیماری

**درمان:** عمل جراحی که شایع ترین روش فیکو ۳ می باشد.

### پیشگیری



- عدم مصرف دخانیات
- کاهش وزن
- کنترل قندخون
- استفاده از عینک آفتابی در خارج منزل

### مراقبت های قبل از عمل

- آزمایشات استاندارد جراحی مانند شمارش کامل گلبولی، نوار قلب
- قطره های گشاد کننده مردمک قبل از جراحی تجویز می شود.
- آموزش به بیمار در خصوص نحوه استفاده از داروهای چشمی جهت پیشگیری از عفونت و التهاب

### مراقبت های بعد از عمل

- شناسایی علائم هشدار (خونریزی سر درد به همراه درد چشم، ترشح چرکی) و در صورت مشاهده سریع به اورژانس خلیلی مراجعه نماید.
- باید از سرفه و عطسه، قرار گرفتن در معرض تکان های شدید و زور زدن هنگام اجابت مزاج تا حد امکان خودداری شود.

## آب مروارید

شماره سند: ب-۱۰-۱۰-۱۰۱

از وارد کردن هرگونه فشار و مالیدن چشم عمل شده خودداری شود.

- پس از عمل آب مروارید، توصیه می شود برای جلوگیری از یبوست از مقدار مناسب سبزیجات، میوه و آب استفاده شود.
- داروهای تجویز شده توسط پزشک مطابق دستور و سر ساعت استفاده شود.
- به هنگام خواب به مدت ۱ تا ۲ هفته استفاده از محافظ پلاستیکی پس از عمل توصیه می شود و محافظ پلاستیکی هر روز با آب و صابون شستشو و خشک شود.
- درد خفیف پس از عمل را می توان با مصرف استامینوفن کاهش داد، ولی در صورتی که درد از بین نرفت به پزشک معالج مراجعه فرمائید.
- جهت نماز خواندن با انجام تیمم فقط با سنگ مخصوص تیمم توصیه می شود. تیمم بر خاک به علت احتمال آلودگی و عفونت چشم و خم شدن بیشتر از سطح قلب منوع است، بنابراین تا یک هفته پس از عمل، از سجده کردن خودداری کنید و مهر را با دست به پیشانی نزدیک کنید.
- از انجام کارهای سخت و بلند کردن اشیاء سنگین تر از حد معمول و فعالیت های زناشویی تا دو هفته پس از عمل خودداری فرمائید.
- تاری دید و ناراحتی چشم پس از عمل روند رو به بهبود دارد، در صورت بدتر شدن و یا داشتن علائم زیر به اورژانس خلیل مراجعه نماید.
- کاهش دید یا تاری دید درد شدید ناگهانی که با مصرف مسکن بهبود پیدا نکند.
- قرمزی و سوزش شدید چشم و ترشح چرکین.
- دیدن هاله در اطراف چراغ ها.
- درهم دیدن اشیاء.
- حرکت نقاط سیاهرنگ در جهات مختلف.
- دیدن جرقه های نورانی.
- جهت ریختن قطره سر خود را کمی به عقب خم کرده و پلک تحتانی را پایین کشیده و بدون اینکه نوک قطره چکان با چشم تماس پیدا کند، قطره را چکانده و مدت ۳ دقیقه چشم را بیندید.
- در صورتی که بیش از یک نوع قطره توسط چشم پزشک تجویز گردیده، در صورت همزمان شدن قطره ها، بین آن ها پنج دقیقه فاصله بدهید و هنگام خواب نیازی به چکاندن قطره نمی باشد.
- قبل از استفاده از قطره ها حتماً دست ها را با آب و صابون بشویید.
- روز بعد از عمل می توان تمام را شست، اما دقت کنید تا آب به داخل چشم پاشیده نشود و چشم در معرض ضربه قرار نگیرد، زمان حمام کردن به صورت کامل را چشم پزشک تعیین می کند و بهتر است تا یک ماه از شامپو بچه استفاده نمایند.
- به مدت چهار هفته از شنا کردن و انجام ورزش هایی که احتمال بروز ضربه و تکان های شدید وجود دارد مانند (تنیس) خودداری فرمائید.
- برای معاینات بعد از عمل در وقت های تعیین شده توسط پزشک حتماً مراجعه فرمائید.

۱. آب مروارید

۲. انحنای قرنیه یا عدسی

۳. نوعی دستگاه جهت جراحی آب مروارید

منبع: پرستاری بروونر - سودارت بیماریهای چشم ۲۰۱۸

تهیه کننده: ناهید نجفی کارشناس پرستاری



تائید کننده: دکتر شهلا مولوی‌زاد فوک تخصص قرنیه چشم  
شماره سند: ب-۱۰-۱۰-۱۰۱

تابستان ۱۴۰۰