



شماره سند: ب-۱-۱۰-۶۳



## راهنمای آمادگی سونوگرافی در اطفال

### ➤ سونوگرافی شکمی ( Abdominal Sonography )

- در شیرخواران جهت سونوگرافی سیستم گوارش ، در صورتی که تنها مشمول کبد و کیسه صفرا می باشد، نوزاد از یک ساعت قبل نبایستی شیر بخورد.
- در اطفال جهت سونوگرافی سیستم گوارش ، در صورتی که تنها مشمول کبد و کیسه صفرا می باشد، کودک از ۳-۴ ساعت قبل نبایستی هیچ چیز (به خصوص غذا و مایعات چرب به دلیل ترشح صفرا) بخورد.
- در شیرخواران و اطفال جهت سونوگرافی سیستم گوارش ، در صورتی که جهت بررسی معده و تنگی دریچه پیلور معده باشد، معده نوزاد بایستی کاملاً پر باشد.

### ➤ سونوگرافی لگن و سیستم ادراری ( KUB & Pelvic Sonography )

باید مثانه پر باشد (توجه: در صورت بررسی همزمان شکم و لگن، مایعات ساده مانند آب و آبمیوه مصرف شود و مایعات چرب مثل شیر به کودک داده نشود).

منبع: Merrills Atlas Of Radiographic Positioning & Procedures

تهیه کننده: مریم سلامیان کارشناس رادیولوژی

واحد آموزش ارتقاء سلامت

تابستان ۱۴۰۰