



انواع انسولین



شماره سند: ب-۱۰-۵۳


انسولین های قلمی



❖ لانتوس (گلارژین) : این انسولین طولانی اثر می باشد. (طوسی رنگ) بنفش کمرنگ و طول اثر آن ۲۴ ساعته است.



❖ انسولین لومید: این انسولین طولانی اثر می باشد.



❖ انسولین توجئو: این انسولین طولانی اثر میباشد و این نوع انسولین در افراد زیر ۱۸ سال استفاده نمی شود.



انواع انسولین



شماره سند: ب-۱۰-۵۳



- ❖ انسولین نوورپید (اسمارت): به رنگ نارنجی کم رنگ می باشد و سریع الاثر (۳-۵ ساعت) می باشد و ظرف مدت کمتر از ۱۵ دقیقه قبل از غذا تزریق شود. اوج اثرش ۱۵ دقیقه تا یک ساعت بعد از تزریق می باشد.



- ❖ انسولین آپیدرا : به رنگ آبی کم رنگ می باشد و سریع الاثر می باشد و ۲۰-۳۰ دقیقه قبل از غذا تزریق شود.



- ❖ انسولین نومیکس: سورمه ای رنگ می باشد و مخلوط دونوع انسولین سریع الاثر و نسبت ۳۰٪ و انسولین متوسط الاثر به نسبت ۷۰٪ می باشد و ۱۵ دقیقه قبل از مصرف غذا تزریق شود و دراطفال مصرف ندارد.

حاوی هر دو مواد شفاف و کدر است و ۱۰ مرتبه بالا و پائین چرخانده شود و برای تزریق باید بطور کامل مخلوط و شیری رنگ شود ولی نباید تکان شدید داده شود و فقط در دست غلطانده شود در این نوع حتماً باید منظم بوده و استفاده دقیق و سروقت انسولین و میان وعده‌ها رعایت شود.



انواع انسولین




شماره سند: ب-۱۰-۵۳

محل های تزریق انسولین

* قسمت های خارجی ران

* قسمت فوقانی بازو

* شکم (ترجیحاً در محدوده ۵cm اطراف ناف تزریق نشود.)



طریقه تزریق

با زاویه ۹۰ درجه تزریق زیر پوستی انجام می شود و محل تزریق به مدت ۵-۸ ثانیه فشارداده شده تا با خارج کردن سر سوزن انسولین به خارج نشست پیدا نکند.

اقدامات مراقبتی



- انسولین ها تا زمانی که مصرف نشده است حتماً باید در یخچال نگه داشته شود.
- بعد از شروع استفاده در دمای محیط تا یک ماه، قابل استفاده است و نیازی به یخچال ندارد. البته اگر آن ها در یخچال قرار دهید مشکلی پیش نمی آید.
- اگر قلم انسولین استفاده شده، در معرض نور آفتاب قرار نگرفته و در دمای محیط نگهداری شده باشد می توان تا یک ماه مورد استفاده قرار داد.
- اگر هنوز مصرف نشده و قرار است حمل شود باید در کیف حاوی یخ نگهداری شود.
- در افراد جوان تر و بیمار و لاغر ممکن است دچار حملات افت ناگهانی قند خون شوند.
- قلم ها فریز نشوند.
- تزریق عضلانی انجام نشود.
- در هیچ نوع انسولین، ذرات جامد نباید مشاهده شود.

منبع : پرستاری داخلی جراحی بروونر-سودارت عدد ۲۰۱۸

تبیه کننده : نجمه رنجبر کارشناس پرستاری

تأثید کننده : دکتر مریم معتمدی فوق تخصص غدد اطفال

ناظر کیفیک فاطمه غالبی سوپر وایز رآموزش سلامت

تابستان ۱۴۰۳